

CALENDRIER DE RATRAPAGE 2013

VACCIN TETANIQUE PASTEUR®
IMOVAX POLIO®
D.T.VAX®
REVAXIS®
REPEVAX®
BOOSTRIX TETRA®
TETRAVAC-ACELLULAIRE®
INFANRIX TETRA®
PENTAVAC®
INFANRIX QUINTA®
INFANRIX HEXA®
Act-Hib®

Valence :
 T
 P
 DT
 dTP
 dTcaP
 dTcaP
 DTCaP
 DTCaP
 DTCaPHib
 DTCaPHib
 DTCaPHibHB
 Hib

Nature des vaccins : Anatoxine : Diphtérie (D ou d(dose atténuée)), Tétanos (T), Coqueluche acellulaire (ca) ; Virus entier inactivé : Polio injectable (P) ; Polyoside : *Haemophilus influenzae* type b (Hib).

PHASE DE TRANSITION CHEZ L'ENFANT AVEC LES VACCINATIONS INITIEES ANTERIEUREMENT

Règle générale : toute nouvelle primovaccination suit le nouveau calendrier vaccinal. Pour toute personne ayant déjà reçu un ou des vaccins avant la mise en place de ce nouveau calendrier vaccinal, **le principe général est de se recalcr le plus rapidement sur le nouveau calendrier :**

- **Pour les nourrissons ayant reçu**, selon l'ancien schéma vaccinal « 3+1 » :
 - la première dose de primovaccination (hexavalent ou pentavalent) à deux mois, il convient de poursuivre avec le nouveau calendrier : deuxième dose à l'âge de 4 mois (intervalle de deux mois), puis rappel à 11 mois ;
 - les deux premières doses de primovaccination (2 et 3 mois), il convient de continuer à 4 mois le schéma initial des trois doses avec l'ancien calendrier « 3+1 », et de poursuivre avec le nouveau schéma à partir du rappel à 11 mois. En cas de décalage, l'intervalle entre la troisième dose et le rappel doit être d'au moins six mois ;
 - les trois doses de la primovaccination à un mois d'intervalle (hexavalent-pentavalent-hexavalent ou pentavalent seul), il convient d'administrer le rappel à 11 mois et de poursuivre avec le nouveau schéma. L'intervalle minimal entre la troisième dose et le rappel doit être de six mois.
- **Les enfants ayant reçu :**
 - quatre doses en primovaccination (trois doses de la série initiale + rappel à 16-18 mois), il convient de poursuivre avec le nouveau schéma (DTCaPolio à 6 ans) ;
 - un vaccin dTPolio (ou dTcaPolio) à 6 ans, il convient d'administrer un vaccin DTCaPolio entre 11 et 13 ans. Pour ceux ayant reçu un DTCaPolio à 6 ans, il convient d'administrer un dTcaPolio entre 11 et 13 ans. Dans les deux cas, poursuivre avec un dTcaPolio à 25 ans ;
 - un vaccin DTCaPolio ou dTcaPolio ou dTPolio à 11-13 ans, il convient de poursuivre avec le vaccin dTcaPolio à 25 ans.
- **Les jeunes ayant reçu** un vaccin dTPolio ou dTcaPolio à 16-18 ans, il convient de poursuivre avec le nouveau schéma avec un rappel de vaccin dTcaPolio à 25 ans.

PERIODE de TRANSITION avec les administrations effectuées antérieurement										
Enfants									Adultes	
Transition	2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	16-18 ans	25 ans	
Dernière injection effectuée selon le calendrier vaccinal précédent	Poursuite selon le nouveau calendrier vaccinal	DTCaPHibVHB		DTCaPHibVHB	DTCaPHibVHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHibVHB	DTCaPHib	DTCaPHibVHB	*DTCaPHibVHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHibVHB	DTCaPHib	DTCaPHibVHB	*DTCaPHibVHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHibVHB	DTCaPHib	DTCaPHibVHB		DTCaPHibVHB	DTCaP	dTcaP		dTcaP
							dTP/ dTcaP**	DTCaP		dTcaP
							DTCaP**	dTcaP		dTcaP
								DTCaP/dTcaP		dTcaP
									dTP/dTcaP	dTcaP

* L'intervalle minimal entre la 3^e dose et ce rappel doit être de 6 mois ; **Hors recommandation précédente
 D,d : Diphtérie (d : dose réduite d'anatoxine) ; T : Tétanos ; P : Poliomyélite ; Ca, ca : Coqueluche acellulaire (ca : dose réduite d'Ag coquelucheux) ; Hib : *Haemophilus influenzae* de type b ; VHB : Hépatite B

TABLEAU DE TRANSITION ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL 2013 DE L'ADULTE (rappels dTP) : Règles générales

Règles générales :

• Après l'âge de 25 ans, le prochain rappel dTP à effectuer est déterminé par les règles suivantes :

1) Le délai par rapport au dernier rappel effectué doit être de plus de cinq ans. Si ce délai est inférieur à cinq ans, le prochain rappel sera effectué au rendez-vous vaccinal à âge fixe suivant (n+1) : soit un intervalle maximum de vingt-cinq ans.

ET

2) L'intervalle entre le dernier rappel effectué et le prochain rendez-vous vaccinal à âge fixe (n) ne doit pas excéder vingt-cinq ans. Si ce délai est supérieur à vingt-cinq ans, un rappel immédiat est alors pratiqué. Le délai entre ce rappel et le prochain rendez vous vaccinal à âge fixe (n) devra être d'au moins cinq ans. Si ce délai est de moins de cinq ans, le recalage sera différé au rendez vous vaccinal à âge fixe suivant (n+1).

Exemples :

Personne de 33 ans, dernier rappel à 30 ans → prochain rappel au rendez-vous vaccinal à âge fixe de 45 ans (n)

Personne de 43 ans, dernier rappel à 40 ans → prochain rappel à l'âge fixe de 65 ans (n+1) [et non à 45 ans (n)]

Personne de 35 ans, dernier rappel à 18 ans → rappel immédiat. Prochain rappel à l'âge fixe de 45 ans (n)

Personne de 43 ans, dernier rappel à 18 ans → rappel immédiat. Prochain rappel à l'âge fixe de 65 ans (n+1) [et non à 45 ans (n)]

• Après l'âge de 65 ans, le prochain rappel dTP à effectuer est déterminé par les règles suivantes :

1) Le délai par rapport au dernier rappel effectué doit être de plus de cinq ans. Si ce délai est inférieur à cinq ans, le prochain rappel sera effectué au rendez-vous vaccinal à âge fixe suivant (n+1) : soit un intervalle maximum de quinze ans.

ET

2) L'intervalle entre le dernier rappel effectué et le prochain rendez-vous vaccinal à âge fixe (n) ne doit pas excéder quinze ans. Si ce délai est supérieur à quinze ans, un rappel immédiat est alors pratiqué. Le délai entre ce rappel et le prochain rendez vous vaccinal à âge fixe (n) devra être d'au moins cinq ans. Si ce délai est de moins de cinq ans, le recalage sera différé au rendez-vous vaccinal à âge fixe suivant (n+1).

Exemples :

Personne de 68 ans, dernier rappel à 63 ans → prochain rappel à l'âge fixe de 75 ans (n)

Personne de 73 ans, dernier rappel à 70 ans → prochain rappel à l'âge fixe de 85 ans (n+1) [et non à 75 ans (n)]

Personne de 66 ans, dernier rappel à 40 ans → rappel immédiat et prochain rappel à l'âge fixe de 75 ans (n)

Personne de 72 ans, dernier rappel à 50 ans → rappel immédiat et prochain rappel à l'âge fixe de 85 ans (n+1) [et non à 75 ans (n)]

		Rappels de 25 à 65 ans									
		Age lors de la consultation									
		25/29	30/34	35/39	40/44	45	46/49	50/54	55/59	60/64	65
Age lors du dernier rappel effectué	15/19	puis 45	puis 45	puis 45	puis 65	puis 75	puis 75				
	20/24	45	45	45	45	puis 65	puis 65	puis 65	puis 65	puis 75	puis 75
	25/29	45	45	45	45	puis 65	puis 65	puis 65	puis 65	puis 75	puis 75
	30/34		45	45	45	puis 65	puis 65	puis 65	puis 65	puis 75	puis 75
	35/39			45	45	puis 65	puis 65	puis 65	puis 65	puis 75	puis 75
	40/44				65	65	65	65	65	65	puis 75
	45/49						65	65	65	65	puis 75
	50/54							65	65	65	puis 75
	55/59								65	65	puis 75
	60/64									75	75

		Rappels au-delà de 65 ans									
		Age lors de la consultation									
		66/69	70/74	75	76/79	80/84	85	86/89	90/94	95	
Age lors du dernier rappel effectué	15/19	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	20/24	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	25/29	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	30/34	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	35/39	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	40/44	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	45/49	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	50/54	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	55/59	puis 75	puis 85	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
	60/64	75	75	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105	
65/69	75	75	puis 85	puis 85	puis 95	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105		
70/74		85	85	85	85	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105		
75/79			85	85	85	puis 95	puis 95	puis 105	puis 105		
80/84					95	95	95	95	puis 105		
85/89					95	95	95	95	puis 105		
90/94								105	105		

	Rappel immédiat puis prochain rendez-vous vaccinal
	Rappel à effectuer au prochain rendez-vous vaccinal
	Nouveau rendez-vous vaccinaux à age fixe

Calendrier de rattrapage des vaccinations recommandées de base pour les enfants à partir d'un an, les adolescents et les adultes JAMAIS VACCINES

Âge des personnes jamais vaccinées	Personnes concernées	Schémas de vaccination et délais minimum entre les doses	Rappel suivant	Nombre de doses
1 - 5 ans				
Diphtérie (D) Tétanos(T), Polio Coqueluche acellulaire (ca)	Tous	0, 2 mois, 8-12 mois	6 -7 ans (ou ≥ 2 ans après le premier rappel)	4
Haemophilus influenzae b (Hib)	Tous			1
Hépatite B	Tous	0, 1 ou 2 mois, 6 mois		3
Méningocoque C conjugué	Tous			1
Pneumocoques (vaccin Pn 13)	Enfants âgés de 12 à 23 mois	0, 2 mois (intervalle au moins 2 mois entre les doses)		2
Rougeole(R), Rubéole (R), Oreillons (O)	Tous	0, 1 mois		2
6 - 10 ans				
D T Polio Coqueluche acellulaire (ca)	Tous	0, 2 mois, 8-12 mois	11-13 ans (ou ≥ 2 ans après le premier rappel)	4
Hépatite B	Tous	0, 1 ou 2 mois, 6 mois		3
Méningocoque C conjugué	Tous			1
R R O	Tous	0, 1 mois		2
11 - 15 ans				
D T Polio Coqueluche acellulaire (ca)	Tous	0, 2 mois, 8-12mois	A 25 ans : dTPolio dont 1 fois avec dTcaP	4
Hépatite B	Tous	0, 6 mois		2
Méningocoque C conjugué	Tous			1
Papillomavirus (HPV)	Toute jeune fille à 11 ans à 15 ans	0, 1 ou 2 mois, 6 mois		3
R R O	Tous	0, 1 mois		2
≥ 16 ans				
d T Polio (d) ¹ 1 ^{ère} dose avec ca ²	Tous	0, 2 mois, 8-12 mois	A 25 ans : dTPolio	4
Méningocoque C conjugué	Tous jusqu'à l'âge de 24 ans révolus			1
Papillomavirus (HPV)	Jeunes femmes de 16 à 19 ans révolus	0, 1 ou 2 mois, 6 mois		3
R R O	Tous nés depuis 1980	0, 1 mois		2
	Femmes nées avant 1980 en âge de procréer ³			1

1 dTPolio : vaccin combiné diphtérie tétanos, poliomyélite avec une charge réduite d'anatoxine diphtérique (d).

2 dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d'anatoxine diphtérique (d) et d'antigènes coquelucheux (ca).

3 dans le cadre du rattrapage de la vaccination contre la rubéole pour les femmes en âge de procréer.